

ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)

ΤΜΗΜΑ Γ – Στοιχεία της αίτησης*:

(*προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ: τα παρακάτω δεδομένα δύνανται να δημοσιοποιούνται, να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται με την συγκατάθεση των ως άνω χρηστών, σε κάθε περαιτέρω διαδικασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη του Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύει.)

1. Αιτούμενο/α* Φυτοπροστατευτικό/α Προϊόν/όντα	α/α	Εμπορικό όνομα	Δραστική/ες ουσία/ες	ΑΑΔΑ (αν υφίσταται)	PPPAMS (αποδεικτικό)
	1	PROBEL 1,8 EC	abamectin	14688/14.02.2019	Θα κατατεθεί μόλις είναι διαθέσιμο

(*προστίθενται όσες γραμμές είναι απαραίτητο)

2. Πεδίο εφαρμογής*:	ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (Ψεκάσμος φυλλώματος πριν την εκκόλαψη)
----------------------	---

(*αναφέρεται και τυχόν συγκεκριμένο στάδιο της παραγωγής ή συγκεκριμένο σύστημα παραγωγής όπως βιολογική γεωργία, για το οποίο αιτείται η χρήση)

3. Στόχος:	<i>Eryophyes</i> spp. (ERPHSP)
------------	--------------------------------

(*αναφέρεται και τυχόν συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης, για το οποίο αιτείται η χρήση)

4. Χρονικό διάστημα για το οποίο αιτείται η παρέκκλιση:	Έναρξη	Λήξη
	15/02/2026	15/05/2026
Αιτιολόγηση σε περίπτωση απρόβλεπτου κινδύνου*:		

(*υποχρεωτικό για αιτήσεις με χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο μηνών μεταξύ αιτούμενης ημερομηνία έναρξης και πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης)

5. Βασική αιτιολόγηση του κινδύνου*:

	Περιπτώσεις	Αιτιολόγηση
1)	Απουσία εγκεκριμένων φ.π. και μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης για την αιτούμενη χρήση	Τα τελευταία τρία έτη έχει εμφανιστεί η παραμόρφωση των καρπών στις καλλιέργειες της ροδακινιάς και της νεκταρινιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πέλλας-Ημαθίας, καθώς και σε άλλες περιοχές, σε μια έκταση αρκετά μεγάλη της τάξης των 30000 στρεμμάτων, η οποία και επεκτείνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινδυνεύει το σύνολο των στρεμμάτων (400000 στρέμματα), καθώς το φαινόμενο αυτό εμφανίζει δυναμική και ταχύτατη τάση εξάπλωσης και σε άλλες εκτάσεις. Ενδεικτικά το φαινόμενο της παραμόρφωσης των καρπών μπορεί να προκαλέσει μείωση της παραγωγής έως 50%. Μετά από συστηματικές προσπάθειες εντοπισμού της αιτίας που προκαλεί την έντονη παραμόρφωση των καρπών, καθώς και μετά από εξέταση μεγάλου αριθμού δειγμάτων από την ευρύτερη περιοχή, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) επιβεβαίωσε την παρουσία διαφόρων ιών, με σημαντικότερους αυτούς της ομάδας <i>Plum pox virus</i> (PPV) και τον ιό της παραμόρφωσης της ροδακινιάς (<i>PLMVd</i>). Εκτός από τη μετάδοση μέσω μολυσμένου πολλαπλασιαστικού υλικού, διαπιστώθηκε ότι ένας βασικός τρόπος διασποράς του φαινομένου είναι το άκαρι του γένους <i>Eriophyes</i>. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη αντιμετώπιση της προσβολής και η μείωση του πληθυσμού των ακάρεων αυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Μ.Φ.Ι. Σε κτήματα όπου παρατηρήθηκε έντονη παραμόρφωση των καρπών, πραγματοποιήθηκαν ψεκάσμοι εντός των εγκεκριμένων χρονικών ορίων χρήσης της δραστικής ουσίας abamectin σε υπαίθριες καλλιέργειες (προϊόν PROBEL 1,8 EC,

ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)

		ΑΔΑΔ 14688), υπό την επίβλεψη τοπικών γεωπόνων. Στόχος των εφαρμογών ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προϊόντος ενάντια στο άκαρι του γένους <i>Eriophyes</i> . Τα αποτελέσματα των ψεκασμών έδειξαν σημαντική μείωση του πληθυσμού των ακάρεων, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της δραστικής ουσίας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν καταχωρημένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στη χώρα μας που να στοχεύουν ειδικά στα άκαρεα του γένους <i>Eriophyes</i> στη ροδακινιά και τη νεκταρινιά. Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί στερούνται ολοκληρωμένων λύσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου, γεγονός που δυσχεραίνει τη διασφάλιση της παραγωγής και του εισοδήματός τους.
2)	Η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας βάσει του τρόπου δράσης των ήδη εγκεκριμένων φπ	Χρειάζονται 4 διαφορετικοί τρόποι δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις διεθνείς βάσεις δεδομένων. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας επομένως, οι καλλιεργητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο ακαρεοκτόνο μόνο μία φορά ανά καλλιεργητική περίοδο και εάν μια δεύτερη εφαρμογή είναι αναγκαία να χρησιμοποιούν ακαρεοκτόνο προϊόν με διαφορετικό τρόπο δράσης. Η δ.ο. Abamectin έχει διαφορετικό τρόπο δράσης IRAC MoA: 6 και είναι κατάλληλο για τη διαχείριση ανθεκτικότητας του <i>Eriophyes</i> spp.

(*επιλέγονται οι περιπτώσεις που ανταποκρίνονται στην αίτηση, οι υπόλοιπες να διαγραφούν

** με παράθεση οικονομικών στοιχείων και στοιχείων αντικτύπου

*** σύμφωνα με διεθνείς και εθνικές βάσεις δεδομένων και καταγραφών, όπως HRAC, IRAC, FRAC, Γάλλανθος)

6. Περιορισμός της αιτούμενης χρήσης*:

1. Στις Περιφερειακές Ενότητες:	α/α	Π.Ε.
	1	ΠΕΛΛΑΣ
	2	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	3	ΦΛΩΡΙΝΑΣ
	4	ΚΟΖΑΝΗΣ
	5	ΗΜΑΘΙΑΣ